
Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



Reserve aSF995 .A147 2015

> BIOSEGURIDAD EN EL CORRAL: cómo mantener a sus aves sanas BACKYARD BIOSECURITY





"BACKYARD BIOSECURITY"

is a simple, three-step process that will help keep your birds and those of your neighbors — free of disease.







exotic Newcastle disease (END), also known as virulent Newcastle disease (vND). Know the warning signs of bird diseases such as avian influenza (AI) and

Early detection can help prevent the spread of disease. While it may be hard to tell if your bird has one of these diseases, if you know the signs, you may be able to tell if something is wrong. See pages 29-30 for signs of illness and photos.

Early detection is important to prevent the spread of disease.



Don't wait. If your birds are sick or dying, call:

SREPORT

- Your local cooperative extension office/agent
- Your veterinarian
- · The State veterinarian or State animal/poultry diagnostic laboratory

toll free at 1-866-536-7593, and we'll put you in touch with a local contact. Or, call USDA's Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) There is no charge for a disease investigation, if one is needed.





When it comes to protecting your birds from disease, there are two things to keep in mind: Keep It Clean and Keep It Away.

Keep It CLEAN

outine will do a lot for the health of your flock: Making these steps part of your bird care

- Wash your hands thoroughly or use hand sanitizer before entering your bird area.
- Change food and water daily.
- other equipment that comes in contact Clean and disinfect cages, tools, and with your birds or their droppings.
- equipment before disinfecting it. Do all Remove any dirt and manure from of this work outside.
- only when feeding and caring for your birds. Wear clean clothes and shoes that you use
- change clothes before entering your home Or, scrub your shoes with disinfectant and so you don't track disease in with you.


Keep It AWAY

carry diseases to your flock. Here are some you've just bought and wild birds-could Other people and birds-including birds tips to keep disease away: Restrict access to your property and your birds. Disinfect any vehicles that enter your farm.

- with poultry. At your own farm, do not Avoid visiting farms or other households et visitors near your birds at all if they have birds of their own.
 - If you can't avoid contact with other clothes and shoes before going near birds or bird owners, change your your own birds again.
- poultry supplies with other farms. If you must, disinfect these items Don't share equipment, tools, or before bringing them home.
- rest of your flock for at least 2 weeks Separate exhibited birds from the after the event.
- and keep new birds separate from your Buy birds from a reputable source, flock for at least 30 days.
- with your flock. If your birds are outside, consider keeping them in a screened area. This will also help keep insects Don't let wild birds have contact and rodents away.
- burial or incineration or take them to a landfill. Check on local ordinances Properly dispose of dead birds by for acceptable disposal methods.

LA "BIOSEGURIDAD EN EL CORRAL"

es un simple proceso de tres pasos que ayudará a mantener la salud de sus aves (y las de sus vecinos).





influenza o AI) y la enfermedad exótica de Newcastle (exotic Newcastle disease o END). Conozca los síntomas de las enfermedades de las aves, como la influenza aviar (avian

-a detección temprana de una enfermedad puede ayudar a evitar su propagación. Aunque puede ser difícil detectar si un ave tiene estas enfermedades, si conoce los síntomas, notará si algo no está bien. Consulte las páginas 29-30 para conocer los síntomas de la enfermedad y ver fotos.

La detección temprana es importante para evitar la propagación de la enfermedad.

INFORME

No espere. Si sus aves están enfermas o se están muriendo, comuníquese con:

- La oficina o su agente de la extensión cooperativa local
- Su veterinario
- El veterinario estatal o el laboratorio de diagnóstico de salud animal/aviar estatal

del USDA al 1-866-536-7593, y ellos lo pondrán en contacto con especialistas locales. O, llame a la línea gratuita del Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas Si es necesario realizar una investigación de la enfermedad, este servicio es gratuito.



Cuando se trata de proteger a sus aves de las enfermedades, debe de recordar dos cosas: mantenga la limpieza y evite el contagio.

Mantenga la LIMPIEZA

Si incorpora estos pasos a su rutina diaria en el corral, la salud de sus aves se verá beneficiada:

- Lávese las manos meticulosamente o use un líquido desinfectante antes de ingresar al corral.
- Cambie la comida y el agua todos los días.
- Limpie y desinfecte las jaulas, herramientas y otro equipo que entra en contacto con las aves o el excremento.
- Retire la tierra y excremento del equipo antes de desinfectarlo. Haga esto afuera del corral.
- Solo use ropa y zapatos limpios cuando alimente y cuide a sus aves, y póngasela solo para eso.
- O límpiese los zapatos con desinfectante y cámbiese de ropa antes de ingresar a su casa, para que no sea portador de ninguna enfermedad.

EVITE el contagio

Otras personas y aves, incluso las que acaba de comprar y las aves silvestres, pueden ser portadoras de enfermedades y contagiar a sus animales. Abajo algunos consejos para evitar el contagio: Restrinja el acceso a su propiedad y a sus aves.
 Desinfecte los vehículos que ingresan a su granja.

- No visite otras granjas o propiedades con aves. En su propia granja, no permita que los visitantes se acerquen a sus aves si son propietarios de aves.
- Si no puede evitar el contacto con otras aves o propietarios de aves, cámbiese de ropa y zapatos antes de volver a acercarse a sus animales.
- No comparta equipo, herramientas ni suministros para aves con otras granjas.
 Si no puede evitarlo, desinféctelos antes de traerlos a casa.
- Separe a las aves de exhibición del resto de la bandada durante por lo menos 2 semanas después del evento.
- Compre aves de un proveedor responsable y mantenga a las nuevas aves separadas de las demás durante por lo menos 30 días.
- No permita que las aves silvestres tengan contacto con sus animales. Si las aves están al aire libre, considere mantenerlas en una zona cercada con malla metálica. Esto también evitará que entren insectos y roedores.
- Deseche de manera apropiada los restos de animales muertos enterrándolos, incinerándolos o trasladándolos al vertedero local. Entérese de las normas respecto a los métodos aceptables de desecho.



January

		9	13	20	27	
ruary		2	12	19	56	
		4	11	18	25	
rua	*	E	10	17	24	
Feb		7	6	16	23	
	2	_	8	15	22	20
			7	14	21	20

Sat 2	6	16	23	30
Fri New Year's Day Día de Año Nuevo	Ø	15	22	53
Thu	7	14	21	58
Wed	9	13	20	27
Tue	S	12	. Day 19 (ing. Jr.	56
Mon	4	#	Martin Luther King, Jr., Day Día de Martin Luther King, Jr.	25
Sun NOTES:	m	10	17	24

Wash up.

Scrub your hands thoroughly with soap and water before and after working with your birds. Use hand sanitizer if soap and water are not readily available.

Lavese

Lávese meticulosamente las manos con agua y jabón antes y después de trabajar con sus aves. Si no hay agua o jabón, utilice desinfectante para manos.







February

it		0	_	
Sat 6	13	20	27	
iE rv	12	19	26	
тћи 4	11	18	25	
wed	10	17	24	
Tue 2	6	Washington's Birthday Cumpleaños de Washington	23	NOTES:
Mon 1	∞	Mashin Cumple	22	29
Sun	_	14	21	28

Name of Street,

Clean and disinfect equipment, including cages and tools, that comes in contact with your birds or their droppings. Be sure to clean this equipment outside of your house.

nfecte el equipo confacto con aves o

Limpie y desinfecte el equipo que entre en contacto con aves o excrementos, incluyendo las jaulas y las herramientas. Asegúrese de limpiar este equipo afuera de su casa.





March

Sat 5	12	19	56	
Fri 4	11	18	25	NOTES:
Thu w	10	17	24	31
Wed 7	6	16	23	30
Tue 1	co	15	22	59
Mon	7	14	21	28
Sun	9	13	20	27

Stay healthy while enjoying your backyard flock!

Birds that appear healthy can carry germs that can make people sick, such as Salmonella. Always wash your hands after touching live poultry or anything in the area where they live and roam.

(Cultre su salud mientras distruta de sus aves de corral)

Las aves que parecen sanas pueden ser portadoras de gérmenes que se trasmiten a las personas, como Salmonella. Siempre lávese las manos meticulosamente con agua y jabón después de tocar aves de corral vivas o cualquier cosa que esté en la zona donde viven y rondan.





	Sat	C
	Fri	-
Control of the Contro	Thu	
	Wed	
	Tue	
The second secon	Mon	
	Sun	NOTES:

Sat	7	
Fri	1	
Thu		
Wed		
Tue		
Mon		
Sun	NOTES:	

Sat 2	6	16	23	30
Fri	œ	15	22	29
Thu	7	14	21	28
Wed	9	13	20	27
Tue	ro	12	19	56
Mon	4	11	18	25
Sun NOTES:	m	10	17	24

keep them separate from the rest When you bring new birds home, of your flock for at least 30 days.

manténgalas separadas del resto de su bandada durante por lo menos 30 días. Cuando traiga nuevas aves a casa,





Sat	7	14	21	28	
Fri	9	13	50	27	
Thu		12	19	56	
		1	—	2	
Wed	4	11	18	25	NOTES:
Tue	m	10	17	24	av ado Caido
Mon	2	6	16	23	30 Memorial Day Dia del Soldado Caldo
Sun	1	co	15	22	59

Do Votte Hornework


Buy your birds from a reputable hatchery, feed store, or dealer. Learn how to care for the breeds

you buy.

Compre aves de un proveedor, comerciante o tienda de animales de

buena reputación. Aprenda cómo cuidar

las razas que compre.



Sat 4	11	18	25	
iī w	10	17	24	NOTES:
Thu 2	6	16	23	30
Wed	œ	15	22	59
Tue	7	14	21	28
Mon	9	13	20	27
Sun	ហ	12	19	56

Oress for success.

Keep separate clothes and shoes for working with your birds. Don't wear these items back into your house—change first.

antes de entrar a su casa.

Separe la ropa y zapatos que usa al trabajar con sus aves. Cámbiese de ropa





Sat

"Assessing	Thu	
	Wed	
	Tue	
	Mon	
	Sun	NOTES:

00
-
_
9
ហ
Independence Day Dia de la Independencia
Indeper Dia de
m

15	22	53
14	21	28
13	20	27
12	19	56
11	18	31
10	17	24



Visit: http://healthybirds.aphis.usda.gov and www.cdc.gov/zoonotic/gi

30

23

16

and know how to spot contagious Look your birds over frequently See page 29 for photos of the bird diseases. Early detection can be the best prevention. signs of illness.

sepa cómo reconocer las enfermedades temprana puede ser la mejor forma de prevención. En la página 29 puede ver Examine a sus aves frecuentemente y contagiosas de las aves. La detección fotos de los síntomas de enfermedad.



August

Sat 6	13	20	27	
Έ rυ	12	19	56	
тhи 4	11	18	25	NOTES:
wed	10	17	24	31
Tue 2	6	16	23	30
Mon 1	∞	15	22	29
Sun	7	14	21	28

тон укме указ

Always observe wildlife, including wild birds, from a distance. Don't pick up or touch dead wild birds. Avoid bird droppings.

incluidas las aves silvestres. No recoja ni toque a las aves silvestres muertas.

Evite los excrementos de las aves.

Siempre observe de lejos la fauna,





Septembel

Sat	10	17	24	
Fri 2	6	16	23	30
Thu 1	∞	15	22	29
Wed	7	14	21	28
Tue	9	13	20	27
Mon	Labor Day Día del Trabajo	12	19	26
Sun NOTES:	4	11	18	25



Visit: http://healthybirds.aphis.usda.gov and www.cdc.gov/zoonotic/gi

them home to avoid disease spread. See pages 31-32 for cleaning tips. Don't lend or borrow equipment disinfect items before bringing owners. If you must, clean and from neighbors or other bird

propagación de enfermedades. En las páginas

antes de traerlo a casa para evitar la

33-34 encontrará consejos de limpieza.

indispensable, limpie y desinfecte el equipo No preste ni se preste equipo de vecinos u otros propietarios de aves. Si es



October

Sat	co	15	22	59		
Ή	7	14	21	28		
Thu	9	13	20	27	V	
Wed	ru	12	19	26		
Tue	4	11	18	25	31	
Mon	m	10 Columbus Day Día de Colón	17	24	30	
Sun NOTES:	2	6	16	23		

Protect year flock,

Keep your birds in a screened area to protect them from predators and wild birds. This will also help protect your birds' food and water from contamination.

Esto también evitará que la comida

y el agua se contaminen.

Mantenga a sus aves en un área cercada con malla metálica para protegerlas de depredadores y aves silvestres.



November

	Sat	ហ	12	19	56	
	<u> </u>	4	Veterans Day Día de los Veteranos	18	25 SE	
	Thu	m	10	17	24 Thanksgiving Day Día de Acción de Gracias	NOTES:
	Wed	7	6	16	23	30
	Tue		∞	15	22	29
- I work to the second	Mon		7	14	21	28
11/1	Sun		9	13	20	27



Visit: http://healthybirds.aphis.usda.gov and www.cdc.gov/zoonotic/gi

Call It and

To report a wild bird that has died, contact your State, tribal, or Federal natural resources agency.

Para informar sobre una ave silvestre muerta, comuníquese con la agencia de recursos naturales federal, tribal o estatal.



ecember

. 1	<u>-</u>	2
	Thu	T.
	Wed	
	Tue	
	Mon	
	Sun	NOTES:

Christmas Day Navidad

25

24

23

22

21

20

You are your birds' best protection.

Usted es la mejor protección que tienen sus aves.



¿Puede identificar los síntomas de un ave enferma? Can you spot the signs of a sick bird?



Parálisis completa

Complete paralysis

Purple discoloration of the wattles and comb S Manchas moradas en la carúncula y la cresta

Swelling of the tissue around the eyes and neck Hinchazón del tejido alrededor de los ojos y cuello

Twisting of the head and neck (torticollis) Cabeza o cuello torcido (tortícolis)

USDA file photos | Fotos de archivo USDA

Many bird diseases are difficult to diagnose. It is important to know the signs of bird diseases so you can tell when something might be wrong. If more than one bird in your flock is ill or dies, this could be the start of a devastating outbreak. Early detection of signs can help keep the disease from spreading.

Avian Influenza (AI)

Al viruses can infect chickens, turkeys, pheasants, quail, ducks, geese, and guinea fowl, plus a wide variety of wild birds.

AI can strike poultry quickly without any signs of infection and spread rapidly. If you spot any of these signs, take action immediately by calling your extension office/agent, local veterinarian, State veterinarian, or State animal/poultry diagnostic laboratory. Or, call USDA's toll-free number (1-866-536-7593) for a local contact.

El diagnóstico de muchas de las enfermedades de las aves es difícil. Es importante que conozca los síntomas de las enfermedades de las aves para poder detectar si algo no está bien. Si más de un ave en su bandada se enferma o muere, puede ser el comienzo de un brote devastador. La detección temprana de los síntomas puede ayudar a evitar la propagación de la enfermedad.

influenza aviai

Los virus de influenza aviar pueden infectar a las gallinas, pavos, faisanes, codornices, patos, gansos y gallinas de guinea, así como también a una gran variedad de aves silvestres. La influenza aviar puede atacar a las aves de corral de manera rápida, sin que presenten síntomas de infección, y propagarse rápidamente. Si identifica alguno de los siguientes síntomas, tome medidas inmediatas y llame a su oficina/agente de extensión, al veterinario local, al veterinario estatal o al laboratorio de diagnóstico de salud animal/aviar estatal. O llame a la línea gratuita del USDA al 1-866-536-7593 y lo pondrán en contacto con especialistas locales.

Signs of Al

- Sudden death without any signs
- Lack of energy and appetite
 - Decreased egg production
- Swelling of the head, eyelids, misshapen eggs Soft-shelled or
 - Purple discoloration of the comb, wattles, and shanks wattles, comb, and legs

- (difficulty breathing) Gasping for air
 - Nasal discharge (runny nose)
- Coughing, sneezing
- and neck (torticollis) Twisting of the head
- Stumbling or falling down
 - Diarrhea

Síntomas de la influenza aviar

- Falta de energía y apetito producción de huevos ningún indicio previo Muerte repentina sin Disminución en la
- Huevos deformes o con cáscara suave
- Hinchazón de la cabeza, carúncula y corvejones párpados, cresta,

- carúncula, la cresta y las patas Manchas moradas en la
- Dificultad para respiral
- Secreción nasal (goteo nasal)
- Tos, estornudos
- Cabeza o cuello torcidos (tortícolis)

Tropiezos o caídas Diarrea

Exotic Newcastle Disease (END)

birds. END spreads quickly and can infect and cause death END is a deadly viral disease that can affect all species of even in vaccinated poultry.

by calling your extension office/agent, local veterinarian, If you spot any of these signs, take action immediately State veterinarian, or State animal/poultry diagnostic laboratory. Or, call USDA's toll-free number (1-866-536-7593) for a local contact.

Signs of END

- Sudden death and increased death loss in flock
- Sneezing, gasping for air, nasal discharge, coughing
- Greenish, watery diarrhea
- twisting of head and neck, circling, complete stiffness Decreased activity, tremors, drooping wings,
- Swelling around the eyes and neck

Enfermedad exótica de Newcastle

afecta a todas las especies de aves. Se propaga rápidamente y puede La enfermedad exótica de Newcastle la causa un virus mortal que infectar y causar la muerte incluso a aves de corral vacunadas. Si identifica alguno de los siguientes síntomas, actúe inmediatamente /eterinario estatal, o al Iaboratorio de diagnóstico de salud animal/ aviar estatal. O llame a la línea gratuita del USDA al 1-866-536-7593 y llame a su oficina/agente de extensión, al veterinario local, al y lo pondrán en contacto con especialistas locales.

Síntomas de la enfermedad exótica de Newcastle

Muerte repentina y aumento de pérdidas por muertes en la bandada de aves Estornudos, dificultad para respirar, secreción nasal y tos Actividad disminuida, temblores, alas caídas, cabeza Diarrea verdosa y líquida

o cuello torcidos, vueltas en círculos y rigidez completa Hinchazón alrededor de ojos y cuello

Information You Can Use

Cleaning and Disinfecting

you first clean all dirt and manure from your tools, cages, boots, and equipment. Be sure to clean these outside of your Cleaning and disinfecting are important steps to keep your birds' environment healthy. Disinfectants work best when house to keep germs outside.

If you remove your birds from their enclosure, you will be able to do a more thorough cleaning. Take out all old litter, manure, and other debris, and then clean and disinfect the area.

- **1.** Mist the area lightly with water to avoid stirring up dust particles when cleaning.
- **2.** Then, do a "dry" cleaning by brushing, scraping, and shoveling off manure, feathers, and other materials from surfaces to be disinfected.
- **3.** Next, do a "wet" cleaning with preferably warm water and detergent. Work from top to bottom and back to front.
- **4.** Once you've rinsed all surfaces, apply a disinfectant according to directions on the label. Be sure to use a U.S. Environmental Protection Agency-registered disinfectant that is effective against AI virus or other diseases of concern. This information will be on the label.
- 5. Leave the enclosure empty until it is completely dry.


Also, check out Program Aid No. 2026, "Cleaning and Disinfecting Checklist for Backyard Poultry Owners," on the Biosecurity For Birds Web site at http://healthybirds.aphis.usda.gov.

Footbath

As an extra precaution, have a disinfectant footbath to walk through when entering and leaving your bird area. Be sure to scrape your boots or shoes free of debris before entering the footbath. Also, **change the footbath frequently**—at least every few hours—to maintain its effectiveness. If the footbath gets too dirty, the disinfectant won't work. For more information on footbaths, see Program Aid No. 1885, "Biosecurity Guide for Poultry and Bird Owners," available online at http://healthybirds.aphis.usda.gov.

Wash Your Hands

Remember to wash your hands thoroughly with soap and warm water when you are finished working with your birds. This is important because birds that appear healthy can be carrying germs that can make people sick, such as Salmonella bacteria. Hand washing is a simple step that will help keep you healthy while you enjoy your backyard flock.



Wild Birds

waterfowl should not have contact with your flock. If your birds are outdoors, try to keep them in a screened area to prevent Wild birds can carry several diseases, including avian influenza. Because of their disease risk, game birds and migratory interaction with wild birds.

Here are some tips if you do come into contact with wild birds:

- Do not pick up diseased or dead wild birds. Contact your State, tribal, or Federal natural resources agency if you find a sick or dead wild bird.
- Wash your hands immediately after handling any wild birds.
- Change clothes before feeding or handling your flock.
- Cook meat thoroughly to an internal temperature of 165 °F before eating wild game.

If you hunt, take routine precautions:

- Don't harvest, handle, or eat wild birds that are obviously sick or found dead.
- Dress your game birds in the field whenever possible.
- Wear rubber gloves while cleaning game or cleaning bird feeders.
- Do not eat, drink, smoke, or rub your eyes while handling wild birds.
- · Wash your hands after cleaning game.
- Clean and disinfect all tools and work surfaces.

Información útil

Limpieza y desinfección

son más efectivos si antes limpia toda la suciedad y excrementos de sus herramientas, jaulas, botas y equipo. Asegúrese La limpieza y la desinfección son pasos importantes para mantener saludable el entorno de sus aves. Los desinfectantes de limpiar estos afuera de su casa para que no entren los gérmenes.

Si saca las aves del corral, será más fácil hacer una limpieza profunda. Quite todo el viejo lecho de paja, el excremento y otros desechos, y luego limpie y desinfecte el área.

- **1.** Humedezca ligeramente las superficies para evitar que se levanten las partículas de polvo al limpiar.
- **2.** Luego, haga una limpieza "seca," cepillando, raspando y quitando con una pala el excremento, las plumas y otros materiales de las superficies que se desinfectarán.
- 3. Después, haga una limpieza "húmeda" preferiblemente con agua tibia y detergente. Trabaje en dirección de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante.
- **4.** Una vez que haya enjuagado todas las superficies, aplique un desinfectante según las indicaciones de la etiqueta. Asegúrese de usar un desinfectante registrado por la Agencia de Protección Ambiental (*Environmental Protection Agency*) que sea efectivo para combatir el virus de la influenza aviar u otras enfermedades de riesgo. Esta información se encuentra en la etiqueta.
- **5.** Espere que el corral se seque totalmente antes de volver a poner a las aves dentro.

También, consulte el material de programa No. 2026S: "Lista de verificación de la limpieza y desinfección para propietarios de corrales", en la página web sobre la bioseguridad de las aves en http://healthybirds.aphis.usda.gov.

Enjuague de calzado

Como precaución adicional, coloque un enjuague de calzado con desinfectante para sumergir los zapatos al entrar y salir del corral. Asegúrese de limpiar sus botas o zapatos de todo material adherido antes de sumergirlos en el enjuague. Además, **cambie el líquido de enjuague con frecuencia**, por lo menos cada 3 horas, para mantener su efectividad. Si el enjuague está demasiado sucio, el desinfectante no surte efecto. Para mayor información sobre enjuagues de calzado, vea el material de programa No. 1885S: "Guía de bioseguridad para los propietarios de aves", disponible en Internet en http://healthybirds.aphis.usda.gov.

Lávese las manos

Acuérdese de lavarse meticulosamente las manos con agua tibia y jabón cuando haya terminado de trabajar con las aves. Esto es importante porque las aves que parecen sanas pueden ser portadoras de gérmenes que causan enfermedades en las personas, como la bacteria de Salmonella. Lavarse las manos es un paso sencillo que lo ayudará a mantenerse sano mientras disfruta de sus aves de corral.

Aves silvestres

las aves acuáticas migratorias deben tener contacto con su bandada de aves. Si sus aves están en el exterior, intente mantenerlas Las aves silvestres pueden transmitir muchas enfermedades, incluida la influenza aviar. Debido a esto, ni las aves de caza ni en un área cercada con una malla metálica para impedir la interacción con las aves silvestres.

Algunas sugerencias en caso de entrar en contacto con aves silvestres:

- a la agencia de recursos naturales local, estatal, tribal o federal si encuentra un ave silvestre enferma o muerta. No recoja aves silvestres enfermas o muertas. Llame
- Lávese las manos inmediatamente después de tocar aves silvestres.
- Cámbiese de ropa antes de alimentar o entrar en contacto con sus aves de corral.
- Cocine la carne totalmente hasta que la temperatura interna sea de 165 °F antes de comer aves silvestres.

Si sale de cacería, tome las siguientes precauciones de rutina:

- No recoja, toque ni coma aves silvestres que están obviamente enfermas o que encontró muertas.
- Prepare y coma las aves silvestres en el campo siempre que sea posible.
- Use guantes de jebe cuando limpie animales silvestres o los comederos de las aves.
- No coma, beba, fume ni se frote los ojos mientras está manipulando aves silvestres.
- Lávese las manos después de limpiar animales silvestres.
- Limpie y desinfecte todas las herramientas y superficies de trabajo.

Jalenda


















LOOK for Signs. si hay síntomas **OBSERVE**





PROTEJA a sus aves. **PROTECT Your Birds**

United States Department of Agriculture

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Animal and Plant Health Inspection Service

Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas

Cover Photo Credit: Getty, Anthony Lee Cover: New Hampshire Red Roosters | Gallinas rojas de New Hampshire

USDA is an equal opportunity provider and employer.
USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

Program Aid No. 2171 • Issued October 2015 Material para programa No. 2171S • Emitido en octubre 2015



